SE Bruksanvisning

EURneffy®

nässpray, lösning i endosbehållare

adrenalin

Innan du behöver använda nässprayen, försäkra dig om att du vet när och hur EURneffy ska användas.

EURneffy nässpray



Följ dessa anvisningar endast när läkemedlet ska användas.

A



Ta ut EURneffy nässpray ur förpackningen.
Dra upp förpackningen för att ta ut EURneffy nässpray.

B



Håll nässprayen såsom visas.
Håll nässprayen med tummen mot kolvens bas och ett finger på vardera sidan av munstycket.

- **Dra inte och tryck inte på kolven.**
- **Testa inte och spraya inte i förväg. Varje nässpray innehåller endast en dos.**

C



För in nässprayens spets i en näsborre tills fingrarna rör vid näsan.
Håll munstycket rakt i näsan och riktat mot din panna.
Vinkla inte nässprayen mot näsans inre eller yttre väggar.

D



Tryck upp kolven stadigt tills den snäpper upp och sprayar in i näsborren.



Vinkla inte nässprayen mot näsans inre eller yttre väggar.

Sök akutsjukvård

Sök omedelbart akutsjukvård för noggrann övervakning av den anafylaktiska reaktionen och för eventuell ytterligare behandling.

Övervaka patientsymtom



Om symtomen fortsätter att förvärras eller återkommer efter cirka 10 minuter, eller vid eventuellt doseringsfel, ge en andra dos med en ny EURneffy nässpray i SAMMA näsborre som den första dosen och sök omedelbart akutsjukvård.

Om så behövs kan du ligga ned med fötterna högt.
Om detta gör att du blir andfådd ska du sätta dig upp.
Medvetslösa patienter ska placeras i stabilt sidoläge.
Om symtomen inte försvinner bör du om möjligt ha en annan person hos dig tills medicinsk hjälp anländer.

ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm, Danmark

FI Käyttöohjeet

EURneffy®

nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus

adrenaliini

Tutustu ennen käyttöä EURneffy-valmisteeseen sekä siihen, milloin ja miten sitä tulisi käyttää.

EURneffy-nenäsumute



Lue ohjeet tarkkaan ennen sumuttimen käyttöä.

A



Poista EURneffy-nenäsumute pakkauksesta.
Avaa pakkaus vetämällä ja ota esiin EURneffy-nenäsumute.

B



Pidä nenäsumutetta kuvan osoittamalla tavalla.
Pidä nenäsumutetta niin, että peukalo on männän alla ja pullon suutin kahden sormen välissä.

- **Älä vedä tai työnnä mäntää.**
- **Älä testaa tai sumuta etukäteen, sillä jokainen nenäsumute sisältää vain yhden annoksen.**

C



Työnnä nenäsumutteen kärki sieraimeen, kunnes sormet koskettavat nenääsi.
Pidä suutin nenässä suorassa niin, että se osoittaa kohti otsaasi.
Älä kohdista nenäsumutetta nenän sisä- tai ulkoseinämää kohti.

D



Paina mäntää ylöspäin lujasti, kunnes se naksahtaa ja suihkuttaa valmistetta sieraimeen.



Älä kohdista nenäsumutetta nenän sisä- tai ulkoseinämää kohti.

Hakeudu ensiapuun

Hakeudu välittömästi ensihoitoon, jotta anafylaktista reaktiota voidaan seurata tarkasti ja antaa tarvittaessa jatkohoitoa.

Seuraa potilaan oireita



Jos oireet pahenevat tai niitä ilmenee uudelleen noin 10 minuutin kuluttua tai jos annostelussa on tapahtunut virhe, annetaan toinen annos uudella EURneffy-nenäsumutteella SAMAAN sieraimeen kuin ensimmäinen annos ja hakeudutaan kiireellisesti lääkäriin.

Tarvittaessa voit asettua makuulle jalat kohotettuna. Jos hengittäminen tuottaa vaikeuksia tässä asennossa, sinun pitää nousta istumaan. Tajuttomat potilaat on asetettava kylkiasentoon. Jos oireet eivät häviä, sinun on mahdollisuuksien mukaan pysyttävä toisen henkilön seurassa, kunnes saat lääkinnällistä apua.

ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm, Tanska